



Řez révy

Kolik oček ponechat na keři při zimním řezu révy vinné?

Réva vinná plodí na jednoletém dřevě. Zimní očka(pupeny) jsou u révy vinné složená z očka hlavního a dvou oček vedlejších. Na letorostu vyrůstajícího z hlavního očka je největší násada květenství a většinou také největší hrozny. Teoreticky mohou ze zimního očka vyrůst tři letorosty. Při podlomu se potom na keři ponechá většinou pouze jeden letorost z jednoho zimního očka. Počet oček ponechaný při zimním řezu na keři v takovém případě určuje počet letorostů.

Vliv řezu na kvalitu hroznů



Zahrádkáři častěji pěstují stolní odrůdy révy. Ty jsou náročnější na teplo a slunce. Není proto vhodné keře přetěžovat vysokou úrodou, protože ta se negativně projeví na vzhledu hroznů, velikosti hroznů a bobulí a chuťové kvalitě. **Obr.1** názorně ukazuje proměnlivost vzhledu a kvality hroznů na letorostu. Na každém letorostu je vidět jeden velmi dobře vyvinutý hrozen. Další hrozny jsou pak menší a také začínají později vyzrávat, což je vidět na vybarvení bobulí. U stolních odrůd je proto vhodné kombinovat počet oček ponechaných při řezu na keři s redukcí násady hroznů během vegetace. **Obr.2** ukazuje keř, kde byla násada ovlivněna pouze počtem oček při zimním řezu.

Na očku jsou však i tři letorosty. Násada hroznů je proto velmi vysoká. **Obr.3** ukazuje odrůdu MOLDOVA, kde byla naopak provedena redukce násady hroznů na jeden hrozen na letorost. MOLDOVA potom prokazuje vynikající kvalitu hroznů.



Při zahrádkářském pěstování je proto vhodné na keři ponechat jeden dlouhý tažen s počtem 8-16 oček jako na **obr.4** nebo dva tažně s počtem 6-8 oček na tažen jako na **obr.5**.



Jak již bylo uvedené, kombinuje se zatížení při zimním řezu s redukcí násady hroznů. U stolních odrůd se většinou odstraňují celé hrozny. Na keři se ponechává vždy pouze jeden, nejlépe vyvinutý hrozen na letorost.



Násada na pergolách

K přetížení keřů plodnými očky častěji dochází na pergolách nebo jiných kordónových tvarech. I u těchto tvarů je třeba očka ponechaná při řezu na keři počítat. Na kordónových tvarech často dochází k intenzivnímu rašení ze spících oček, takže má velmi významnou úlohu také podlom! **Obr.6** ukazuje kordónový tvar se zcela optimálním počtem oček ponechaných na keři. Keře s kordónovými tvary je třeba zatěžovat plodnými očky postupně a pozorovat, jak na zatížení keř reaguje. Jestliže dochází ke slabému růstu a vývoji menších hroznů, je třeba provést omezení násady hroznů během vegetace a v zimě potom ponechat nižší počet zimních oček na keř. U kordónových tvarů se využívá řez na čípký nebo krátké tažně.



V textu jste se mohli setkat s termíny zatížení a podlom.

Zatížením se rozumí počet oček ponechaných na keři při zimním řezu. Podlom se potom provádí po rašení oček, nejčastěji ve stadiu, kdy mají letorosty délku 10-15cm což zpravidla bývá koncem května. **Z jednoho oka** mohou vyrůst až tři letorosty, ale při zahrádkářském pěstování révy vinné se 2 letorosty vylámu a ponechá se růst jen jeden nejsilnější letorost.